



Espaces vectoriels euclidiens : projections, angle orienté dans le plan, orthogonalité

Pierre Mathonet

Présentation provisoire

Département de Mathématique
Faculté des Sciences

Liège, le 28 mars 2013

Angle orienté du plan

- Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 2.
- La donnée de l'orientation définit un sens “de rotation”. Si $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ est une base positive, le sens positif consiste à “aller de b_1 vers b_2 ”.

Définition 13.1

Soit (u, v) un couple de vecteurs non nuls. L'angle orienté entre u et v est l'unique angle $\theta \in [0, 2\pi[$ tel que

- $\cos(\theta) = \cos(\alpha) = \frac{\langle u, v \rangle}{|u||v|}$ (α est l'angle non orienté entre u et v)
- $\sin(\theta)$ est positif (strictement) si, et seulement si (u, v) est une base positive.

Calcul explicite et exemples

Proposition 13.2

Soit (u, v) un couple de vecteurs non nuls. L'angle orienté θ entre u et v est défini par

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{|u||v|} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{\det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix}}{|u||v|}$$

si u et v ont pour composantes $(u_1, u_2)^\sim$ et $(v_1, v_2)^\sim$ dans une *base orthonormée positive*.

Une équation vectorielle

- Soit $a \neq 0$ et $b \in E$, espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3.
- On cherche les solutions de l'équation

$$a \wedge x = b. \quad (13.1)$$

- On peut l'écrire dans une B.O. positive.

Proposition 13.3

L'équation (13.1) est compatible si, et seulement si, $\langle a, b \rangle = 0$. Dans ce cas l'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ -\frac{1}{|a|^2} a \wedge b + \lambda a : \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

Complément orthogonal

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n .

Définition 13.4

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , le *complément orthogonal* de F est l'ensemble

$$F^\perp = \{u \in E : \langle u, f \rangle = 0, \quad \forall f \in F\}.$$

Proposition 13.5

Pour tout sous-espace vectoriel F de E ,

- 1 L'ensemble F^\perp est un sous-espace vectoriel ;
- 2 On a $E = F \oplus F^\perp$;
- 3 On a $\dim(F^\perp) = n - \dim(F)$;
- 4 On a $(F^\perp)^\perp = F$.

Projection orthogonale

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n et F un sous-espace vectoriel.

Définition 13.6

Pour tout $u \in E$, on a la décomposition unique $u = u_F + u_{F^\perp}$. La projection orthogonale de u sur F est u_F .

Proposition 13.7

Si (f_1, \dots, f_p) est une base orthonormée de F , alors la projection orthogonale d'un vecteur u sur F est donnée par

$$u_F = \langle u, f_1 \rangle f_1 + \dots + \langle u, f_p \rangle f_p.$$

Droites et hyperplans

Proposition 13.8

Si d est une droite vectorielle de vecteur directeur v , alors la projection orthogonale de u sur d est

$$u_d = \frac{\langle u, v \rangle}{|v|^2} v.$$

Définition 13.9

Si π est un hyperplan vectoriel, on appelle *normale* à π tout vecteur directeur de π^\perp .

Proposition 13.10

Si π est un hyperplan vectoriel de normale N , alors la projection orthogonale de u sur π est

$$u_\pi = u - \frac{\langle u, N \rangle}{|N|^2} N.$$

Equation normale d'un hyperplan et orthogonalité

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n muni d'une base orthonormée $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$.

Proposition 13.11

Si l'hyperplan π admet l'équation cartésienne

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0,$$

alors le vecteur $N : (a_1, \dots, a_n)$ (dans \mathcal{B}) est normal à π . La réciproque est vraie.

Définition 13.12

Deux sous espaces vectoriels F et G de E sont orthogonaux si on a $\langle f, g \rangle = 0$ pour tous $f \in F$ et $g \in G$. On note alors $F \perp G$.

De manière équivalente, on a $F \perp G$ si $F \subset G^\perp$ ou encore si $G \subset F^\perp$.