

Distances de variétés affines, perpendiculaire commune

Pierre Mathonet

Présentation provisoire

Département de Mathématique
Faculté des Sciences

Liège, le 18 avril 2013

Un exemple graphique


Dans un repère orthonormé, considérons le graphe \mathcal{P} de la fonction

$$f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{x},$$

et

$$\mathcal{Q} = \{(x, 0) : x \in]0, +\infty[\}.$$

On a $d(\mathcal{P}, \mathcal{Q}) = 0$, mais la distance n'est pas réalisée.



Distance de deux ensembles

Définition 15.1

La distance entre deux sous-ensembles \mathcal{P} et \mathcal{Q} non vides de \mathcal{A} est définie par

$$d(\mathcal{P}, \mathcal{Q}) = \inf\{d(P, Q) : P \in \mathcal{P}, Q \in \mathcal{Q}\}.$$

Rappels :

- La borne inférieure d'un ensemble (non vide) $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}$ est un *minorant* de \mathcal{E} : on a

$$\inf \mathcal{E} \leq x \quad \forall x \in \mathcal{E}.$$

- Il n'y a pas de "meilleur" minorant de \mathcal{E} :

$$\forall y > \inf \mathcal{E}, \exists x \in \mathcal{E} : x < y.$$

- La borne inférieure $\inf \mathcal{E}$ est *réalisée* si $\inf \mathcal{E} \in \mathcal{E}$.
- Par exemple $\inf [1, 4]$ est réalisée, $\inf]2, 4]$ ne l'est pas.

2

Le cas des variétés affines

Proposition 15.2

La distance de deux variétés affines $\mathcal{V} = A + \vec{\mathcal{V}}$ et $\mathcal{V}' = B + \vec{\mathcal{V}'}$ est toujours réalisée. Elle vaut $|u|$ si u est la projection orthogonale de \overrightarrow{AB} sur $(\vec{\mathcal{V}} + \vec{\mathcal{V}'})^\perp$.

Preuve :

- On décompose \overrightarrow{AB} en $v + v' + u$, $v \in \vec{\mathcal{V}}$, $v' \in \vec{\mathcal{V}'}$, $u \in (\vec{\mathcal{V}} + \vec{\mathcal{V}'})^\perp$;
- Cette décomposition est unique si $\vec{\mathcal{V}} \cap \vec{\mathcal{V}'} = \{0\}$;
- On pose $A_0 = A + v$, $B_0 = B + v'$;
- On a $u = \overrightarrow{A_0 B_0}$;
- On a $d(\mathcal{V}, \mathcal{V}') = d(A_0, B_0)$.

4

Cas particuliers, hyperplans

Corollaire 15.3

La distance d'un point P à une variété affine \mathcal{V} est toujours réalisée : on a $d(P, \mathcal{V}) = d(P, P')$ où P' est la projection orthogonale de P sur \mathcal{V} .

Corollaire 15.4

Soient $\pi = A + \vec{\pi}$ un hyperplan, n une normale à cet hyperplan et $P \in \mathcal{A}$. On a alors

$$d(P, \pi) = \frac{|\langle \vec{AP}, n \rangle|}{|n|}$$

En particulier, si dans un repère orthonormé π admet pour équation

$$\pi \equiv c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = b$$

et si P a pour coordonnées $(p_1, \dots, p_n)^\sim$, alors on a

$$d(P, \pi) = \frac{|c_1 p_1 + \dots + c_n p_n - b|}{\sqrt{c_1^2 + \dots + c_n^2}}.$$

P. Mathonet, Université de Liège, Faculté des Sciences, Département de Mathématique.

Le cas des droites

Corollaire 15.5

Soit $d = A + \rangle u \langle$ et soit $P \in \mathcal{A}$. Alors on a

$$d(P, d) = |\vec{AP}| \sin \alpha,$$

où α est l'angle non orienté entre \vec{AP} et u .

En particulier, pour un espace affine euclidien de dimension 3, on a

$$d(P, \mathcal{D}) = \frac{|\vec{AP} \wedge u|}{|u|},$$

où le produit vectoriel est calculé dans une orientation quelconque.

P. Mathonet, Université de Liège, Faculté des Sciences, Département de Mathématique.

Droites et plans en dimension 2 et 3

Proposition 15.6

Si $\dim \mathcal{A} = 2$, et si les droites \mathcal{D} et \mathcal{D}' sont sécantes, alors $d(\mathcal{D}, \mathcal{D}') = 0$. Si \mathcal{D} et \mathcal{D}' sont parallèles, alors on a $d(\mathcal{D}, \mathcal{D}') = d(P, P')$ pour tout $P \in \mathcal{D}$, si P' est la projection de P sur \mathcal{D}' .

Proposition 15.7

Si $\dim \mathcal{A} = 3$, et si π et π' sont sécants, alors $d(\pi, \pi') = 0$. Si π et π' sont parallèles, alors on a $d(\pi, \pi') = d(P, P')$ pour tout $P \in \pi$, si P' est la projection de P sur π' .

Proposition 15.8

Si $\dim \mathcal{A} = 3$, et si \mathcal{D} et π sont sécants, alors $d(\mathcal{D}, \pi) = 0$. Si \mathcal{D} et π sont parallèles, alors on a $d(\mathcal{D}, \pi) = d(P, P')$ pour tout $P \in \mathcal{D}$, si P' est la projection de P sur π .

P. Mathonet, Université de Liège, Faculté des Sciences, Département de Mathématique.

Droites en dimension 3

Le cas des droites sécantes ou parallèles est clair. Traitons celui des droites gauches.

Proposition 15.9

Les droites gauches $\mathcal{D} = A + \rangle u \langle$ et $\mathcal{D}' = B + \rangle u' \langle$ ont une distance égale à

$$d(\mathcal{D}, \mathcal{D}') = \frac{|[\vec{AB}, u, u']|}{|u \wedge u'|}.$$

Il existe un unique couple de points $P \in \mathcal{D}$, $P' \in \mathcal{D}'$ tels que

$$d(P, P') = d(\mathcal{D}, \mathcal{D}').$$

Ces points déterminent la droite perpendiculaire commune à \mathcal{D} et \mathcal{D}' .

P. Mathonet, Université de Liège, Faculté des Sciences, Département de Mathématique.

Angles de droites et hyperplans

Définition 15.10

L'angle des droites $\mathcal{D} = A+\rangle u\langle$ et $\mathcal{D}' = A'+\rangle u'\langle$ est l'angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ déterminé par

$$\cos \alpha = \frac{|\langle u, u' \rangle|}{|u||u'|}.$$

Définition 15.11

L'angle d'une droite \mathcal{D} et d'un hyperplan π vaut $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ où α est l'angle entre \mathcal{D} et une normale quelconque \mathcal{N} à π . On a donc

$$\sin \beta = \frac{|\langle u, n \rangle|}{|u||n|},$$

où u est un vecteur directeur de \mathcal{D} et n une normale à π .

9

Angle de deux hyperplans

Définition 15.12

L'angle de deux hyperplans π et π' est l'angle α entre deux de leurs droites normales quelconques. On a donc

$$\cos \alpha = \frac{|\langle n, n' \rangle|}{|n||n'|}$$

où n et n' sont des normales à π et π' respectivement.

10