



Bases, Composantes, calcul matriciel, changements de bases

Pierre Mathonet

Présentation provisoire

Département de Mathématique
Faculté des Sciences

Liège, le 20 Février 2013

Rappels

Définition

Une base d'un espace vectoriel E est une famille ordonnée de vecteurs qui est libre et génératrice. Un espace vectoriel est de dimension finie s'il admet une base ayant un nombre fini d'éléments.

Rappels

Définition

Une base d'un espace vectoriel E est une famille ordonnée de vecteurs qui est libre et génératrice. Un espace vectoriel est de dimension finie s'il admet une base ayant un nombre fini d'éléments.

Définition

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, le nombre d'éléments d'une base quelconque est appelé *la dimension* de E , et noté $\dim(E)$, ou $\dim E$.

Rappels

Définition

Une base d'un espace vectoriel E est une famille ordonnée de vecteurs qui est libre et génératrice. Un espace vectoriel est de dimension finie s'il admet une base ayant un nombre fini d'éléments.

Définition

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, le nombre d'éléments d'une base quelconque est appelé *la dimension* de E , et noté $\dim(E)$, ou $\dim E$.

Par extension, si $E = \{0\}$, alors on pose $\dim(E) = 0$.

Proposition

Une partie \mathcal{B} est une base de E si, et seulement si, tout élément de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des éléments de \mathcal{B} .

Rappels

Définition

Une base d'un espace vectoriel E est une famille ordonnée de vecteurs qui est libre et génératrice. Un espace vectoriel est de dimension finie s'il admet une base ayant un nombre fini d'éléments.

Définition

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, le nombre d'éléments d'une base quelconque est appelé *la dimension* de E , et noté $\dim(E)$, ou $\dim E$.

Par extension, si $E = \{0\}$, alors on pose $\dim(E) = 0$.

Proposition

Une partie \mathcal{B} est une base de E si, et seulement si, tout élément de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des éléments de \mathcal{B} .

Propriétés supplémentaires

Proposition

Soit E un espace vectoriel de dimension n .

- ① *Toute partie génératrice contenant exactement n éléments est une base ;*
- ② *Toute partie libre contenant exactement n éléments est une base ;*
- ③ *Toute partie génératrice contient une base ;*
- ④ *Toute partie libre est incluse dans une base.*

Propriétés supplémentaires

Proposition

Soit E un espace vectoriel de dimension n .

- 1 *Toute partie génératrice contenant exactement n éléments est une base ;*
- 2 *Toute partie libre contenant exactement n éléments est une base ;*
- 3 *Toute partie génératrice contient une base ;*
- 4 *Toute partie libre est incluse dans une base.*

Conséquences :

- 1 $u_1 = (1, 2)^\sim$ et $u_2 = (3, 4)^\sim$ forment une base de \mathbb{R}^2 parce qu'ils sont linéairement indépendants.

Propriétés supplémentaires

Proposition

Soit E un espace vectoriel de dimension n .

- 1 *Toute partie génératrice contenant exactement n éléments est une base ;*
- 2 *Toute partie libre contenant exactement n éléments est une base ;*
- 3 *Toute partie génératrice contient une base ;*
- 4 *Toute partie libre est incluse dans une base.*

Conséquences :

- 1 $u_1 = (1, 2)^\sim$ et $u_2 = (3, 4)^\sim$ forment une base de \mathbb{R}^2 parce qu'ils sont linéairement indépendants.
- 2 $v_1 = (1, 0, 0)^\sim$, $v_2 = (0, 1, 0)^\sim$ et $v_3 = (1, 2, 3)^\sim$ forment une base de \mathbb{R}^3 car ils sont linéairement indépendants.

Dimension d'un sous-espace vectoriel

Proposition

Soient E un espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

- ① On a $\dim(F) \leq n = \dim(E)$;
 - ② Si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.
- (a) Si E ou F est égal à $\{0\}$, il n'y a rien à démontrer.
- (b) Sinon, soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Tout élément de F est combinaison lin. des éléments de \mathcal{B} .

Dimension d'un sous-espace vectoriel

Proposition

Soient E un espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

- ① On a $\dim(F) \leq n = \dim(E)$;
 - ② Si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.
- (a) Si E ou F est égal à $\{0\}$, il n'y a rien à démontrer.
- (b) Sinon, soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Tout élément de F est combinaison lin. des éléments de \mathcal{B} . Une famille libre de vecteurs de F contient donc au plus n vecteurs.

Dimension d'un sous-espace vectoriel

Proposition

Soient E un espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

- ① On a $\dim(F) \leq n = \dim(E)$;
 - ② Si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.
-
- (a) Si E ou F est égal à $\{0\}$, il n'y a rien à démontrer.
 - (b) Sinon, soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Tout élément de F est combinaison lin. des éléments de \mathcal{B} . Une famille libre de vecteurs de F contient donc au plus n vecteurs.
 - (c) On peut donc construire pas à pas une famille (f_1, \dots, f_p) de vecteurs de F , libre et maximale pour l'inclusion.

Dimension d'un sous-espace vectoriel

Proposition

Soient E un espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

- ① On a $\dim(F) \leq n = \dim(E)$;
 - ② Si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.
-
- (a) Si E ou F est égal à $\{0\}$, il n'y a rien à démontrer.
 - (b) Sinon, soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Tout élément de F est combinaison lin. des éléments de \mathcal{B} . Une famille libre de vecteurs de F contient donc au plus n vecteurs.
 - (c) On peut donc construire pas à pas une famille (f_1, \dots, f_p) de vecteurs de F , libre et maximale pour l'inclusion.
 - (d) Alors $p \leq n$ et (f_1, \dots, f_p) est une base de F .

Dimension d'un sous-espace vectoriel

Proposition

Soient E un espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

- ① On a $\dim(F) \leq n = \dim(E)$;
 - ② Si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.
-
- (a) Si E ou F est égal à $\{0\}$, il n'y a rien à démontrer.
 - (b) Sinon, soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Tout élément de F est combinaison lin. des éléments de \mathcal{B} . Une famille libre de vecteurs de F contient donc au plus n vecteurs.
 - (c) On peut donc construire pas à pas une famille (f_1, \dots, f_p) de vecteurs de F , libre et maximale pour l'inclusion.
 - (d) Alors $p \leq n$ et (f_1, \dots, f_p) est une base de F .
 - (e) Si $p = n$, c'est aussi une base de E .

Composantes

Dans ce qui suit, on suppose que E est un e.v. de dimension finie n .

Definition

Soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Pour tout $x \in E$, il existe un unique n -uple $(x_1, \dots, x_n)^\sim \in \mathbb{R}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i b_i$. Ce n -uple est appelé *vecteur de composantes* de x dans la base \mathcal{B} .

Composantes

Dans ce qui suit, on suppose que E est un e.v. de dimension finie n .

Definition

Soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Pour tout $x \in E$, il existe un unique n -uple $(x_1, \dots, x_n)^\sim \in \mathbb{R}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i b_i$. Ce n -uple est appelé *vecteur de composantes* de x dans la base \mathcal{B} .

Notations : $x : (x_1, \dots, x_n)^\sim$ ou $\Phi_{\mathcal{B}}(x) = (x_1, \dots, x_n)^\sim$.

Composantes

Dans ce qui suit, on suppose que E est un e.v. de dimension finie n .

Definition

Soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Pour tout $x \in E$, il existe un unique n -uple $(x_1, \dots, x_n)^\sim \in \mathbb{R}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i b_i$. Ce n -uple est appelé *vecteur de composantes* de x dans la base \mathcal{B} .

Notations : $x : (x_1, \dots, x_n)^\sim$ ou $\Phi_{\mathcal{B}}(x) = (x_1, \dots, x_n)^\sim$.

Proposition

Pour toute base \mathcal{B} de E l'application $\Phi_{\mathcal{B}}$ est une bijection. C'est de plus une application linéaire. En d'autres termes, elle satisfait les conditions suivantes :

- ① pour tous $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $\Phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \Phi_{\mathcal{B}}(u)$,
- ② pour tous $u, v \in E$, on a $\Phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \Phi_{\mathcal{B}}(u) + \Phi_{\mathcal{B}}(v)$.

En particulier, les composantes d'une combinaison linéaire de vecteurs sont obtenues en formant la combinaison linéaire correspondante des vecteurs de composantes, dans \mathbb{R}^n .



Produit matriciel

Nous avons besoin de quelques éléments de calcul matriciel.

Commençons par le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne.

Produit matriciel

Nous avons besoin de quelques éléments de calcul matriciel.
Commençons par le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne.

Definition

Le produit d'une matrice ligne $A = (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}_n^1$ et d'une matrice

colonne $B = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_1^n$ est le nombre AB donné par

$$AB = (x_1 \dots x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Produit matriciel

Nous avons besoin de quelques éléments de calcul matriciel.
Commençons par le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne.

Definition

Le produit d'une matrice ligne $A = (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}_n^1$ et d'une matrice

colonne $B = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_1^n$ est le nombre AB donné par

$$AB = (x_1 \dots x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Exemples :

$$(1 \quad 2 \quad 3) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ e \end{pmatrix} = 2 + 3e,$$



Produit matriciel

Nous avons besoin de quelques éléments de calcul matriciel.
Commençons par le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne.

Definition

Le produit d'une matrice ligne $A = (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}_n^1$ et d'une matrice

colonne $B = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_1^n$ est le nombre AB donné par

$$AB = (x_1 \dots x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Exemples :

$$(1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ e \end{pmatrix} = 2 + 3e, \quad (1 \ e) \begin{pmatrix} \pi \\ 6 \end{pmatrix} = \pi + 6e.$$

Produits matriciels quelconques

Nous avons défini le produit d'une ligne par une colonne contenant le même nombre d'éléments. Cela se généralise facilement. Toute matrice peut être vue comme un empilement de lignes ou une juxtaposition de colonnes.

Définition

Soit $A \in \mathbb{R}_{n \times p}^p$ et $B \in \mathbb{R}_{q \times n}^n$. On écrit $A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_p \end{pmatrix}$ où L_1, \dots, L_p sont des lignes et $B = (C_1 \ \cdots \ C_q)$ où C_1, \dots, C_q sont des colonnes. Alors $AB \in \mathbb{R}_{q \times p}^p$ est définie par

$$(AB)_{i,j} = L_i C_j = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

Quelques exemples

Calculer les produits suivants.

$$1) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ \pi & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad 2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad 3) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \pi & 2 \\ a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \quad 5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \pi & 2 \\ a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 6) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriétés

Proposition

Le produit matriciel a les propriétés suivantes :

① *Il est bilinéaire :*

- *on a $(A + B)C = AC + BC$ pour tous $A, B \in \mathbb{R}_n^p$ et $C \in \mathbb{R}_q^n$;*
- *on a $A(B + C) = AB + AC$ pour tous $A \in \mathbb{R}_n^p$ et $B, C \in \mathbb{R}_q^n$;*
- *on a $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$ pour tous $A \in \mathbb{R}_n^p$, $B \in \mathbb{R}_q^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.*

② *Il est associatif : on a*

$$(AB)C = A(BC)$$

pour tous $A \in \mathbb{R}_n^p$, $B \in \mathbb{R}_q^n$ et $C \in \mathbb{R}_r^q$.

③ *Il n'est en général pas commutatif : les produits AB et BA ne sont simultanément définis et ne donnent des matrices de même type que si A, B sont carrées et de même type. Même dans ce cas, ils ne sont en général pas égaux.*

Le cas des matrices carrées

Dans le cas des matrices carrées de type (n, n) , il existe une matrice particulière, appelée matrice identité et notée I_n ou Id_n qui satisfait les conditions $AI_n = I_nA = A$ pour tout $A \in \mathbb{R}_n^n$.

Le cas des matrices carrées

Dans le cas des matrices carrées de type (n, n) , il existe une matrice particulière, appelée matrice identité et notée I_n ou Id_n qui satisfait les conditions $AI_n = I_nA = A$ pour tout $A \in \mathbb{R}_n^n$.

La matrice I_n est définie par

$$(I_n)_{i,j} = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

pour tous $i, j \leq n$.

Proposition

La matrice identité est l'unique matrice $A \in \mathbb{R}_n^n$ qui satisfait

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.



Matrices inversibles et inverses

Definition

Soit A une matrice carrée de type (n, n) . On dit que A est *inversible* si il existe une matrice $B \in \mathbb{R}_n^n$ telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Dans ce cas, on montre que l'inverse de A est unique et on le note A^{-1} .

Remarque : si B est l'inverse de A , alors A est l'inverse de B .

Exemple : si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, alors $A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Changements de base

Soient $x \in E$ et deux bases différentes $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ et $\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_n)$. On cherche les liens entre les composantes de x dans les deux bases.

Proposition

Les composantes $(x_1, \dots, x_n)^\sim$ et $(x'_1, \dots, x'_n)^\sim$ d'un même élément x de E dans des bases $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ et $\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_n)$ sont liées par les formules

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = A_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad (1)$$

où $A_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $A_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ sont des matrices à n lignes et n colonnes. Les colonnes de $A_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ sont les composantes des éléments de la base \mathcal{B} dans la base \mathcal{B}' . Enfin, les matrices $A_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $A_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ sont inverses l'une de l'autre.